JOURNÉE DE LA TRACHEOTOMIE 2025

Les 7 premiers jours post trachéotomie chez l'enfant : quels risques ? Quelles mesures ?

Dr Sophie BERNARD

21 mars 2025

**Service d'ORL et Chirurgie Cervico-Faciale
CHU Dijon**

Trachéotomie de l'enfant

- Morbi-mortalité 2 à 3 fois supérieure chez l'enfant
- Taux de complication inversement proportionnelle à l'âge

Morbidité Mortalité

	Corbett ¹	Parilla ²	Tantinikorn ³	Wooten CT ⁴	De TREY ⁵	Rawal ⁶
Morbidité précoce (<7 j)	11.2 %	36.8 %	15.5 %	8.5 % (term) 6.3 % (preterm)	20%	26% (<30 j)
Morbidité secondaire (>7 j)	44.8 %		63.5%	39.2 % (term) 44.7 % (preterm)		
Mortalité		39.2%	13 %	20,5 % (term) 12,5 % (preterm)	1%	4.2%

¹Corbett HJ and al. Tracheostomy – a 10 year experience from a UK pediatric surgical *J Pediatr Surg* 2007; 42: 1251-1254

²Parilla C and al. Current trends in paediatric tracheostomies. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2007; 71: 1563-1567.

³Tantinikorn W and al. Outcome in pediatric tracheotomy. *Am J Otolaryngol* 2003; 24: 131-137.

⁴Wooten CT and al. Tracheotomy in the first year of life: outcomes in term infants, the Vanderbilt Experience. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2006; 134: 365-369.

⁵De Trey and al. Pediatric tracheotomy: a 30-year experience. *J Pediatr Surg* 2013; 48: 1470-1475

⁶Rawal and al. Considering a weight criterion for neonatal tracheostomy: an analysis of the ACS NSQIP-P. *The Laryngoscope* 2018; doi : 10.1002 / lary.272

Mortalité

3797 articles / 47 retenus total de 5933 patients

Mortalité : 2.2%-59%

Baisse de la mortalité observée

Table 5 Mortality in children who received a tracheostomy between 1985 and 1994, between 1995 and 2004, and between 2005 and 2014.

Mortality	Decade n (%)			p-Value ^a		
	1985–1994 n = 480	1995–2004 n = 1150	2005–2014 n = 4303	1985–1994 vs. 1995–2004	1985–1994 vs. 2005–2014	1995–2004 vs. 2005–2014
Mortality associated with tracheostomy	10 (2.1)	13 (1.1)	38 (0.9)	0.137	0.012 ^b	0.439
Overall mortality	66 (13.8)	210 (18.3)	458 (10.6)	0.027 ^b	0.039 ^b	<0.001 ^b

^a Chi-square test.

^b p < 0.05.

ANTICIPER LES RISQUES

J0

J7

**Préparation avant
trachéotomie**

**Trachéotomie
chirurgicale**

**Surveillance en
réanimation**

**Changement
de canule**

- **Evaluation pré-opératoire**
- **Anatomie du cou**
- **Etat cardio-pulmonirae**
- **Bilan coagulation**

- **Technique adaptée**
- **Coordination chir/anesth**

- **Prévention des complications**
- **Coordination chir/réa**
- **Protocoles +++**

Technique chirurgicale

- Tête en hyperextension
- Incision cervicale à mi-distance cricoïde / fourchette sternale

- Ouverture ligne blanche
- ^A Libération de la trachée en médian +++ (nerfs récurrents +++)

Technique chirurgicale

- Incision **verticale** entre anneau 3-4 ou 2-3
 - ✓ **Risque désinsertion trachéale**
- Mise en place de fils de rappel
- Retrait progressif de la sonde d'intubation
- Canulation
 - ✓ **Risque faux trajet**
- Branchement du ventilateur

Technique chirurgicale

➤ Fermeture et fixation de la canule

- Fixation tour de cou, assise l'enfant +++
- Fixer les fils de rappels ++++

➤ Transfert en réanimation et information

Consignes post opératoires

- Communication entre équipes
- Contrôle radiologique
- +/- antibioprophylaxie
- Matériel d'urgence en chambre
- Changement de canule à J7
- Nez artificiel

Complications

PETIT CALIBRE DE TRACHÉE ET DE CANULE

- Pas de chemise interne
- Risque de bouchon

TRACHÉE PLUS COURTE

- Risque accru de décanulation

PLAN DE CLIVAGE PERI TRACHÉAL PLUS LAXE

- Risque accru de faux trajet

COU PLUS COURT

- Risque de complications cutanées plus élevées

Risques post –opératoires précoces et mesures

Saignement et infection précoce

Hémorragie orifice trachéal

- Contrôle de l'hémostase per op +++
- Gonfler le ballonnet
- Reprise chirurgicale

Saignement endotrachéal

- Information sur taille et longueur canule
- Limiter les aspirations traumatiques
- Nez artificiel (humidifie et filtre l'air)
- +/- aérosols

Infection

- +/- antibioprophylaxie post opératoire

Risques post –opératoires précoces et mesures

Pneumothorax, pneumomédiastin, emphysème

Pneumothorax,
pneumomédiastin

- Attention aux faux trajet per op
- Gonfler le ballonnet de façon adaptée
- Contrôle radiologique +++

Emphysème sous cutané

- Attention aux fermetures trop hermétiques
- Contrôle radiologique

Risques post –opératoires précoces et mesures

Complications dues à la canule

Décanulation accidentelle

➤ Causes

- Fixation
- Manipulation
- Enfant

- Retirer le cordon et la canule
- tête de l'enfant en hyper extension
- Insérer une canule avec l'aide du mandrin +/- lubrifiant
- Aspirer l'enfant et vérifier la qualité de sa respiration
- Fixer le cordon

- Tracter sur les fils de traction et même procédure

- Canule diamètre inférieur
- Si l'insertion impossible:
 - ✓ écarteur de Laborde ou un spéculum d'oreille
 - ✓ sonde d'intubation de petit calibre par l'orifice

Complications dues à la canule

Décanulation accidentelle

PREVENTION

- Contrôle régulier de la fixation du cordon
- Formation des équipes aux soins et à la recanulation
 - ✓ **Protocoles +++**
- Matériel d'urgence dans la chambre de l'enfant
- Gonfler le ballonnet de façon adaptée
- Attention aux faux trajet per op
- Contrôle radiologique +++ (longueur et position)

Risques post –opératoires précoces et mesures

Complications dues à la canule

Bouchon muqueux

Pas de gêne respiratoire

- Humidifier canule avec gouttes de sérum physiologique
- Aspirer et réitérer l'humidification et l'aspiration jusqu'à obtenir l'extraction du bouchon muqueux

Signes de détresse respiratoire

- Aspirer après avoir humidifier
- Changer la canule
- Mettre de l'oxygène

PREVENTION

- Bien hydrater l'enfant
- Pratiquer des aspirations régulières
- un nez artificiel « humification »

Le premier changement de canule à J7

- En réanimation
- Par un médecin (ORL+++)
- 2 personnes minimum
- Loin des repas
- Sous monitoring cardio-respiratoire
- Préparation du patient et parents
- Éventuellement précédé d'une prémédication
- Préparation du matériel ++

Le premier changement de canule

Etape 1 :

- Lavage des mains
- Placer le billot sous les omoplates > tête en hyper-extension
- Aspirer avant le geste
- Si canule à ballonnet : dégonfler le ballonnet avant le retrait

Le premier changement de canule

Etape 2 :

Couper les cordons en tenant
la canule

Le premier changement de canule

Etape 3 :

- Oter la canule

Le premier changement de canule

Etape 4 :

- Si bonne tolérance respiratoire lavage de l'orifice
- Remettre la nouvelle canule. Puis enlever le mandrin
- Vérifier ventilation
- Si canule à ballonnet : regonfler le ballonnet
- Attacher les cordons en faisant un double nœud

Le premier changement de canule

Etape 5 :

- Vérifier le cordon en plaçant un doigt entre la peau du cou et les cordons.
- Installer la métalline si besoin.

Le premier changement de canule

Etape 6 :

- Si re-canulation facile
- Enlever les fils de traction

CONCLUSION

- Beaucoup de similitude adulte / enfant
- **MAIS** spécificités et risques pédiatriques à connaître
++++
 - ✓ Prévention des accidents (décanulation / faux trajets)
 - ✓ Choix de la canule
 - ✓ Technique chirurgicale
 - ✓ Fixation de la canule
 - ✓ Education thérapeutiques des intervenants (soignants, parents ...)